



Brocarta

Boletín Informativo sobre la broca del café

Número 25

Octubre 22 de 1994

RECOMENDACIONES PARA MANEJAR EL GRANO COSECHADO EN EL RE-RE DE LOS LOTES MAS INFESTADOS CON BROCA

La práctica del RE-RE es imprescindible dentro del programa de manejo integrado de la broca. Esta, consiste en mantener los árboles sin frutos maduros, sobremaduros y secos, mediante recolecciones oportunas y repases según criterio del administrador.

En general se recomienda hacer un repase dos semanas después de la cosecha y de la travesía.

Una vez se realice esta labor se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones :

- Coloque en un punto equidistante de los focos un recipiente para el tratamiento de los frutos cosechados. Este recipiente debe contener la mezcla de agua y malathion 57 al 5% mas un dispersante al 0,5% (agraal - inext - agrotin - triton - etc.). La alternativa es tratar este café brocado con una mezcla de agua y aceite emulsivo al 3%. Los frutos se de-

jan en el recipiente tapado hasta lograr una buena penetración de la mezcla. Sólo se tratan los frutos cosechados en los repases.

- La recolección de los frutos en los focos marcados debe hacerse rápida y rigurosamente, para evitar que la broca que infesta los granos maduros, sobremaduros y secos escape de nuevo hacia el lote.
- Aproveche la pendiente del terreno para recolectar los granos que caen durante la cosecha
- Si al hacer la inspección se observan frecuentemente frutos maduros, sobremaduros y secos en el plato de los árboles, recójalos y sumérjalos rápidamente en el recipiente utilizado para el tratamiento.
- Cuando la cantidad cosechada es poca (menos de 25 Kg) puede resultar más práctico tratar los granos con agua caliente.

OTRAS ACCIONES EN LOS FOCOS

- Elimine los cafetos muertos o improductivos.
- En cafetales con sombrío se debe realizar la sombra y sacar del cafetal toda la leña.
- En caso de ubicar focos de la plaga situados sobre depósitos de agua (charcos, zanjas, depresiones) se debe hacer su drenaje para disminuir la evaporación y el aumento de la humedad relativa.
- Cuando al foco están arribando las brocas que se están reproduciendo en el cafetal de la finca vecina , mantenga una vigilancia especial sobre los primeros tres o cuatro surcos del cafetal que está recibiendo estas migraciones. Se puede hacer una aplicación local de insecticida o establecer una barrera viva o surco trampa.

CAFICULTOR :

NO LE DE OPORTUNIDAD A LA BROCA DE QUEDARSE EN EL CAFETAL

ESTE MATERIAL
ES DE LIBRE REPRODUCCION

Para información adicional
comuníquese con:

Cenicafé

DIVULGACION
Tel. (968)506550 Fax. (968)504723
A.A. 2427 Manizales
Chinchiná - Caldas - Colombia