

# Manejo de roya del cafeto

## Primer semestre 2020

El inicio del control químico de roya debe realizarse 60 días después de ocurrida la floración principal y finalizar antes de los 180 días de ocurrida esta

Cada caficultor debe realizar el ajuste del inicio de control de roya con base en la **ocurrencia de las floraciones principales** en sus lotes y finca

- ✓ La época de menores lluvias desde enero hasta marzo, favoreció las floraciones en las zonas Centro, Norte y Oriente del país. Estas floraciones corresponden a la cosecha principal del segundo semestre de 2020 (agosto y noviembre). **Es momento de proteger la cosecha tempranamente.**
- ✓ En las zonas del Centro y Centro-Sur del país, con dos cosechas en el año y con una mitaca o traviesa de importancia, **debe evitarse la aplicación de fungicidas durante la cosecha.**
- ✓ En Colombia el 17% del área sembrada en café tiene variedades susceptibles a la roya del cafeto, enfermedad que **puede causar pérdidas hasta del 50%** en un ciclo de cuatro cosechas.

La estrategia más rentable y sostenible para el control de la roya del cafeto es la siembra de variedades resistentes como Castillo® Zonales, Cenicafé 1 y Tabi.

### *Caficultor:*

Coseche primero el café y luego aplique el fungicida

Respete los períodos de carencia y reingreso a los lotes para cada producto

Lea cuidadosamente la etiqueta de los productos recomendados, utilice la tecnología de aplicación y los elementos de protección personal

Consulte al Servicio de Extensión

