

Las chisas de la raíz del café

Una plaga que afecta las raíces

- Las chisas, gallina ciega o mojoyoy son larvas de cucarrones, con cuerpo curvado en forma de “C”, blanco-crema.
- Permanecen enterradas en el suelo, entre 30 y 50 cm, allí se alimentan de las raíces de todas las plantas, incluyendo café.
- Los adultos son cucarrones que salen a volar en las noches al inicio de las épocas lluviosas.
- Los mayores daños se presentan durante los primeros seis meses después de sembrar el café.



Para prevenir el ataque por chisas se recomienda:

En las renovaciones por siembras nuevas, donde había cultivos de yuca, maíz y pastos y si encuentra chisas deje el hoyo expuesto al sol durante dos semanas. Si va a utilizar gallinaza y materia orgánica, deben estar secas.

Haga el manejo selectivo de arvenses en las calles del cafetal y mantenga franjas de barbechos con gramíneas para que las chisas no se pasen al café.

En las épocas de lluvias, esté atento a los vuelos de los adultos, se ven en las noches en las paredes de las viviendas cerca de la luz.

Las trampas de luz negra sirven para capturar los adultos y así evitar que las hembras pongan huevos en los lotes de café.



Caficultor:

Las chisas afectan las plantas nuevas de café solo cuando los suelos se dejan limpios. Haga un manejo integrado de arvenses nobles en las calles de la nueva plantación.

Consulte con su Extensionista

