

Aves migratorias en la zona cafetera colombiana



1 Reinita Gargantinaranja (*Dendroica fusca*)

(11,5 cm). Su nombre común se debe al bellissimo color naranja que tiene el macho en su garganta y cara. Se le puede ver frenéticamente cazando insectos en las hojas y ramas de los árboles.

© Jesús Vélez



2 Reinita Amarilla (*Dendroica petechia*)

(11,5cm). Es una de las aves migratorias más comunes en Cenicafé. Está presente durante toda la época de migración. Al parecer es poco gregaria en Colombia, donde mantiene territorios para alimentarse.

© W. Greene/VIREO



3 Abejero (*Piranga rubra*)

(16,5cm). La hembra es de color amarillo oliva, muy diferente al macho. Se alimenta de frutas e insectos tales como las larvas que extrae de nidos de avispas y abejas. Visita frecuentemente comederos provistos de banano.

© A. Morris/VIREO



4 Mirla Buchipecosa (*Catharus ustulatus*)

(16cm). Debe su nombre común a que su pecho es de color crema, con pecas de color marrón. Es principalmente frugívora durante la temporada de migración. También come insectos que caza siguiendo a los ejércitos de hormigas.

© Doug Wechsler/VIREO



5 Degollado (*Pheucticus ludovicianus*)

(18cm). La hembra es de color café y no tiene la mancha roja, tan llamativa en el macho. Usualmente es solitario. Se alimenta principalmente de frutas, pero además incluye insectos en su dieta.

© J. Heidecher/VIREO



6 Turpial de Baltimore (*Icterus galbula*)

(18cm). Este bello turpial no acostumbra cantar durante su estadía en las regiones cafeteras. Frecuenta árboles florecidos en busca de néctar e insectos. También incluye banano y otras frutas en su dieta.

© B. Schorre/VIREO



7 Reinita Azulada (*Dendroica cerulea*)

(11cm). Existe gran preocupación internacional por esta especie, pues sus poblaciones han decrecido en los últimos 20 años. Es común en cafetales de la región de Támesis, Antioquia. Se alimenta de insectos que encuentra al inspeccionar en ramas y hojas.

© A. Morris/VIREO



8 Cebrita (*Mniotilta varia*)

(13cm). Ambos sexos tienen el plumaje con rayas blancas y negras, como las cebras. La hembra es de color más pálido, con manchas crema en los lados del abdomen. Busca insectos en la corteza de los árboles.

© R. Curtis/VIREO



9 Reinita Canadiense (*Wilsonia canadensis*)

(12cm). Un anillo amarillo alrededor de sus ojos y el collar de puntos negros son característicos en esta especie. Frecuenta bosques secundarios, guaduales y cafetales con sombrío. Come insectos que caza inspeccionando hojas y retoños en los árboles.

© R. & N. Bowers/VIREO



10 Reinita Cabecigris (*Oporornis philadelphia*)

(12cm). Esta reinita es muy solitaria y territorial durante el invierno. Se alimenta de insectos y arañas que caza cerca al suelo. Varias veces la hemos observado cazando en los cafetales.

© R. & N. Bowers/VIREO



11 Piranga Alinegra (*Piranga olivacea*)

(16cm). Es parecida a su pariente el Abejero, pero el rojo es más encendido y tiene las alas y la cola negras. Usualmente es solitaria. Se alimenta de insectos y diversos frutos.

© B. Schorre/VIREO

© VIREO STOKE PHOTOGRAPHY

■ Zona de reproducción
■ Zona de invernada
■ Zona de poblaciones residentes



Avance Técnico de Cenicafé No 266

