

Roya del cafeto

(*Hemileia vastatrix*)



Ocasiona defoliación en almácigos y pérdidas entre el 23% al 50% en promedio, y hasta el 80% en la producción, tanto en cantidad y peso, como en calidad física y sensorial.

Factores que favorecen la enfermedad

Variedades susceptibles como Caturra, Típica, Geisha, Catimores (Costa Rica 95) y "varietales" desconocidos. Semilla y almácigo de origen y sanidad desconocido. ❌

Temperatura entre 16 y 28°C, óptimo 22°C. ❌

Altitud entre 1.000 y 2.000 m. ❌

Humedad relativa alta, lluvias al final de la tarde y bajo brillo solar. ❌

Altas densidades de siembra, superior a 10.000 tallos y chupones por hectárea y sombío excesivo superior al 43% según la zona. ❌

Daños físicos, plagas y enfermedades en las raíces. ❌

Cultivos envejecidos, deficiente nutrición, suelos pesados. ❌

Deficientes manejo de arvenses y manejo agronómico. ❌

Alta producción y defoliación, por alta exigencia y desgaste de la planta. ❌

Caficultor:

El manejo más eficaz de la roya del cafeto es la siembra de variedades resistentes desarrolladas por Cenicafé, como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi, provenientes de semilla certificada.

Consulte con su Extensionista

