



Realice el control en el momento oportuno de acuerdo con la región

Antioquia, Caldas, Risaralda, Norte del Tolima, Norte de Cundinamarca, Boyacá

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
					●	●	●				

Magdalena, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Santander, Oriente de Boyacá, Oriente de Cundinamarca, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
					●	●	●				

Quindío, Valle, Sur del Tolima, Sur del Huila

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
					●	●					●

Cauca, Nariño, Norte del Huila

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
●	●										●



- Período seco
- Período húmedo
- Meses para el control químico de la roya del café en variedades susceptibles
- Aplicación opcional

Inicie el control cuando la enfermedad apenas comienza



Consulte con el extensionista de su municipio

La mejor opción de manejo es sembrar Variedad Castillo®

